

ASA LA GUARUPAYA

UBICACIÓN



INFORMACIÓN BÁSICA

ÁREA DE NEGOCIO/ EMPRESA / FILIAL
 Orinoquia

ÁREA OPERATIVA/ INSTALACIÓN
 Castilla-Chichimene

SISTEMA/ TRONCAL
 Cubarral

TIPO
 Producción

PROYECTO
 Bloque Cubarral, Campos Castilla-Chichimene

EXPEDIENTE
 LAM0227

LISTA ROJA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES CONTINENTALES

(Etter et al., 2020).

CR En Peligro Crítico

EN En Peligro

VU Vulnerable Preocupación

LC Menor

Ecosistemas Transformados

SUSTRATO

Aluviones antiguos de relieve plano y suelos fértiles y sedimentos aluviales cuaternarios antiguos francos a arenosos.

(IGAC, 2014).

EXTENSIÓN

286

HECTÁREAS

Extensión preliminar o inicial o antes de la planificación y delimitación de la Ecoreserva.

La verificación se realizó con la proyección de coordenadas "MAGNA_COLOMBIA_CTM12"

3 PREDIOS

NOMBRE DE LOS PREDIOS:

LA CABAÑA, GRANJA EXPERIMENTALEL PORVENIR Y SANTA LUCIA LOTE 2

Ecoreserva en áreas no operativas

MANEJO Y GESTIÓN

TIPO DE PREDIO

Predio Mediano sobre relieve plano a ligeramente inclinado y baja oportunidad de manejo de paisaje prioritario para Restauración

ÁREAS PROTEGIDAS

No hay dentro de la Ecoreserva

PLAN DE MANEJO Y ORDENAMIENTO DE UNA CUENCA (POMCA)

Río Negro - SZH


CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORMACARENA

BIOMAS

BIOMAS ORIGINALES EN LA ECORESERVA

(IDEAM, 2017).

El total del área ocupada por los predios de la Ecoreserva corresponde con territorios transformados.




FISIONOMÍA

Ecosistemas → Bosques Altos Densos, Sabanas herbáceas y arbustivas, pantanos y Lagos, lagunas, ciénagas permanentes, y cauces de ríos mayores
Paisaje → Terrazas Antiguas de grandes ríos, terrazas Antiguas basculadas del Piedemonte, llanura aluvial de desborde "Catalival" y Depresiones

GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD

(IAVH, 2014)

De acuerdo con las estrategias para la gestión integral de la biodiversidad los lineamientos son:



AMENAZAS

PRINCIPALES AMENAZAS PARA LOS ECOSISTEMAS:



- Contaminación orgánica e inorgánica
- Drenaje y desecamiento artificial; canalización de cauces
- Extracción de maderas comerciales
- Intensificación agrícola semipermanente, mecanización agrícola, extirpado, reemplazo desabanas por pastos introducidos y agricultura intensiva (arroz, palma africana), supresión total del fuego, intensificación agrícola, mecanización agrícola, alta fragmentación (Etter et al., 2020).
- Las principales vocaciones de uso son Cultivos permanentes intensivos de clima cálido, Conservación de Recursos Hídricos y Cultivos transitorios semiintensivos de clima cálido.

AMENAZA DE REMOCIÓN


(IDEAM, 2010).

La amenaza de remoción en masa llega hasta:

100%
Bajo

ÍNDICE DE HUELLA HUMANA

(IAVH 2016)



CAMBIO CLIMÁTICO

Entre 2011 a 2040

(IDEAM et al., 2015)

Temperatura media

+0,81 → 1,0 °C


Precipitación

+20 mm

COBERTURAS Y ZONIFICACIÓN


PRINCIPALES COBERTURAS

(IDEAM, 2021).



ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL


(IDEAM, 2021).



CONTEXTO SOCIOECOLÓGICO

POBLACIÓN TOTAL

(A NIVEL MUNICIPAL) (DNP, 2021)



La información demográfica, espacial y de las veredas de influencia de la Ecoreserva esta presentada en los productos plan de biodiversidad y fortalecimiento, gobernanza y negocios verdes.

16 285 habitantes

51,0% Hombres

49,1% Mujeres

0,21% Indígena

0,65% Afrocolombiana

123 Personas pertenecientes a etnias pero no hay territorios étnicos titulados o resguardados.

Hidrocarburos

Ganadería

Ecoturismo

Comercio